

CRITERIOS PARA LA DETECCIÓN PRIMARIA ANTE LA SOSPECHA DE SEPSIS

Triage de enfermería

Valoración del paciente

Monitorización:
TA, Fc, SaTO₂, Glucemia capilar



CRITERIOS DIAGNOSTICOS de SEPSIS. Presencia de 2 ó más signos



Fiebre o hipotermia
($>38^{\circ}\text{C}$ / $<36^{\circ}\text{C}$)



Taquicardia (>90 lpm)



Taquipnea (>20 rpm)

ESCALA DE COMA DE GLASGOW		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
ABERTURA OCULAR	ESPONTÁNEA	4
	VOZ	3
	DOLOR	2
	NINGUNA	1
	ORIENTADA	5
RESPUESTA VERBAL	CONFUSA	4
	INAPROPIADA	3
	SONIDOS	2
	NINGUNA	1
	OBEDECE	6
RESPUESTA MOTRIZ	LOCALIZA	5
	RETIRADA	4
	FLEXIÓN	3
	EXTENSIÓN	2
	NINGUNA	1

GCS <15



Hiperglucemia (>120 mg/dl en ausencia de DM)



Leucocitos
(>12000 y <4000)