

LISTERIA MONOCYTOGENES

**BACTERIA CAUSANTE DE LA LISTERIOSIS:
INTOXICACION ALIMENTARIA DE ALTA LETALIDAD**

GRUPOS DE RIESGO



EMBARAZADAS



MAYORES DE 65 AÑOS



INMUNODEPRIMIDOS




RECIENTE NACIDOS

VIAS DE TRANSMISION




ORAL

Ingesta alimentos contaminados: crudos o procesados



ANIMALES


Sobretudo en especies bovinas



RESISTENTE

A las temperaturas de refrigeración de alimentos

SINTOMAS GASTROINTESTINALES




Además pueden dar lugar a infecciones más graves como: meningitis, septicemia y otras complicaciones potencialmente mortales.




Tratamiento de elección:
ANTIBIOTERAPIA

PREVENCIÓN



Alimentos perecederos consumir lo antes posible




Cocinar bien los alimentos



No consumir productos lácteos sin pasteurizar




Lavado de manos



Limpieza de superficies y tablas de cortar, etc



Lavado abundante de frutas y verduras



Mantener la nevera < 4°C



La Listeriosis es considerada enfermedad de declaración obligatoria individualizada y urgente con datos epidemiológicos básicos en Castilla y León y España