


¿CÓMO TENGO QUE TOMAR EL SINTROM?




**DIETA EQUILIBRADA.
NO VARIAR CANTIDAD
DE ALIMENTOS RICOS
EN VITAMINA K**




**TODOS LOS
DÍAS A LA
MISMA HORA,
CON EL
ESTÓMAGO
VACÍO**

???



**¡LEER
ETIQUETADO!:
EVITAR ACEITES
VEGETALES
HIDROGENADOS**



↓ **EFEECTO**

↑ **EFEECTO**

↑ **VITAMINA K**



**RIFAMPICINA*
DICLOXACILINA
NAFCILINA
GRISEOFULVINA
SUCRALFATO**

**LOVASTATINA
COLESTIRAMINA
COLESTIPOL
ESPIRONOLACTONA
CLORTALIDONA**



**Consulte siempre con su profesional sanitario*

**AAS*
SALICILATOS
TRAMADOL
AINES
FENILBUTAZONA
INDOMETACINA
NAPROXENO
PIROXICAM
TETRACICLINA
CLORANFENICOL
NEOMICINA
ERITROMICINA
COLIMICINA
ÁCIDO NALIDÍXICO
CIPROFLOXACINO
OFLOXACINO
CLINDAMICINA
CEFAZOLINA
AZTREONAM
ISONIAZIDA
FLUCONAZOL
ITROCONAZOL**



**KETOCONAZOL
MICONAZOL
METRONIDAZOL
CEFALOSPORINAS
INHIBIDORES DE
PROTEASAS
INTERFERÓN ALFA Y
BETA
ACARBOXA
CLORPROPAMIDA
TOLBUTAMIDA
RANITIDINA
CIMETIDINA
OMEPRAZOL
LANSOPRAZOL
RABEPRAZOL
FIBRATOS
FENOFIBRATOS
ESTATINAS
ISRS
DERIVADOS TRICÍCLICOS
CLORPROMACINA**